n.° ~~4~~ 1.

Abces Carie de la Cavite glenoide
de Lomoplate, de la tete de Lhumerus
avec Exostose du Corps de Los

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

au Commencement du mois de fevrier 1733. —
une fille de Mr Saboulin Capitaine de navire
agée d'environ Sept à huit mois, Eut —
plusieurs acces de fievre tierce, avec une
Sensibilité à toute la partie Superieure du bras
droit (à laquelle le Medecin & le chirurgien
du lieu ne firent aucune attention quoiqu'en
l'ong usage des febrifuges n'eussent operé
aucun Effet, Et que l'enfant deperit à mesure

ARC 41 n° 87

que la douleur & la fievre augmentoint)
jusqu'au 10e mars, que le bras devint
tendu et enflamé. alors on apliqua
a toute la Circonferance de la partie —
superieure de son bras, un Cataplasme pourrissant.
En Consequance on reconut une fluctuation
sensible depuis la partie moyenne du deltoide
jusqu'à la Clavicule; Ce fut dans cet état
qu'on l'envoya à Bayonne & que je la vis
Le 17e mars.

Quoique cette partie fût toute gonflée, que
la fluctuation fût sensible, après que
toute la Circonferance de l'Extremité
superieure de l'humerus, Elle se —

manifestois neamoins plus sensiblement
En deux Endroits ou la peau se trouvoit
Egalement Eminceée par la presence du pus,
L'un à la partie superieure latteralle de
la poitrine, à lendroit ou finit le tondon
du muscle pectoral & ou Commence sa
partie charnue ; L'autre Sous l'aisselle
partie posterieure interne du bras.
Jouvris L'un & lautre dans toute leur
Etendue, d'ou il sortit Environ une chopine
de pus. Pour ne pas fatiguer L'Enfant
deja affoiblie, je la pancay et le plus Simplement
et le plus promptement qu'il me fut possible
A la levée du premier apareil, il
Sortit quantité de pus de lune & de lautre

ouverture, Cequime fis penser quele
fond n'étoit pas decouvert, quelatêtedelós
pourroit etre alterée, Et les deuxdepots
en aparence n'etre qu'un Seul.
Le 22.e Jedecouvris àlapartie anterieure
un Sinus qui aloit du Côté dela Cavité
glenoide, Jel'ouvris & fendis endeux
lapartie du deltoide attaché àla
Clavicule, Dabort je Crus Etre dans
l'articulation, mais refflechissant Qu'outre
la Capsule qui Enveloppe latête del'humerus,
Cette articulation En à une Seconde
faite parles muscles, Sus Epineux
Sous Epineux, Sous Scapulaire &-

& petit rond. je suspendis mon jugement.

Le 24 je trouvay à la playe posterieure, un sinus qui aloit vers la partie posterieure du Col de l'humerus, dans lequel j'injectay une liqueur deterssive, Le lendemain je mis une tante de ponge preparée dans la longeur du sinus que je veus decouvrir & le 27. je l'ouvris —

Par Cette incision je me trouvay sur la partie superieure posterieure et un peu interne de l'humerus, Ce qui d'acord avec la grande fonte des ~~deux playes~~ et le gonflement exitant de l'articulation, me Confirmoit

que la Capsule pouvoit etre percée &
los altere.

Le 30.e japerceux un scarre au bout de la
Capsule partie anterieure un peu interne
du bras dont la Chûte me faisoit tout
Craindre & que je hatois, dans le dessein
de faire l'amputation a l'article si la tete
de l'os etoit Cariée.

Le 31e Lenfant eut un frisson suivi d'un
violant acces de fievre & Le 1er avril il
parut un sac sous la jonction de lacromium
avec la Clavicule assez profond & un autre
a la partie posterieure. ~~[illegible]~~ Ces deux
Sacs sembloint voulloir decerner los,

Le 2e la fievre fut si vive quelle emporta la malade.

## ouverture de Corps.

Curieux de voir si j'avois bien pensé et de Connoitre quelle etoit la maladie, j'en demanday l'ouverture.

apres avoir Enlevé la peau à toute la Circonference du bras, j'apercus, à la partie moyenne & anterieure de la Capsule un petit trou, qui traversant l'articulation avoit sa sortie à la playe posterieure.

apres avoir detaché le bras de son articulation je trouvay non seulement la Capsule detruite

mais encor la tete de l'os. presque totalement
dennée du Cartilage qui la recouvre, La
Cavité glenoide vermoulue & l'os Exostosé
(que je Conservé) depuis sa partie superieure
jusqu'a sa partie moyenne —

## Reflexion

Je ne doute nulement que le Commencement
de la douleur n'ait étté Celuy de la
maladie de l'os, & que la fievre n'en
ait étté l'accident. il y à aparence
que l'inflamation qui etoit survenue
longtems apres les premieres douleurs

ne s'etoit manifestée que lorsque la
tete de l'humerus et la cavité glenoide
etoint cries et tombes en pourriture.

Dans ce cas l'amputation totale
du membre auroit ette inutille, La
maladie Etant des son principe incurable
Lexortose est encor une preuve
que la maladie à Commencé
par les os.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE